

Particularități ale evoluției sarcinilor la pacientele cu nefropatie lupică – o serie de cazuri clinice

Dr. Anna Mirela Stroie (1), Prof. Dr. Mircea Nicolae Penescu (1, 2) - (1) Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” București, secția clinică Nefrologie II , (2) UMF „Carol Davila” București

Scop:Prezentarea unei serii de cazuri de paciente cu nefropatie lupică la biopsia renală, cu istoric de sarcini.

Material și metodă - Studiu unicentric, cross-secțional, prospectiv.

Parametrii de studiu

-Variabilele clinice – out-come-ul sarcinii, durata bolii, durata tratamentului imunosupresor, tipul de imunosupresor folosit pentru inducție/menținere, inventar de depresie și anxietate Beck, administrat o dată la una din vizitele de follow-up între Martie 2019 – Mai 2020.

-Variabile paraclinice: proteinurie, eRFG-CKD-EPI, clasa de nefropatie lupică

-Datele clinico-paraclinice au fost preluate din fișele de observație recente, și din istoricul electronic (Hipocrate Medical Platform, Romanian Soft Company 2006).


Analiza datelor

- SPSS versiunea 16 –pentru asocieri statistice în grupul populațional total de pacienți, Excell.
- Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, Pearson correlation coefficient.


Semnificația statistică $p < 0.05$.

Rezultate:


- Din 67 pacienți diagnosticați cu nefropatie lupică la biopsia renală, 58 sunt de sex feminin, 8 au istoric de sarcini (efectuată între Ianuarie 2008 – Decembrie 2018).Urmăriți clinic: până în mai 2020.



Din 58 paciente, 8 au istoric de sarcini (13.79%)



Durata bolii la finalul studiului 12 ± 6.41 ani.



Pacientele au avut NL clasele 5 și 4.

Statistică descriptivă	
Vârsta la diagnostic (ani)	24.75 ± 5.7
eRFG-CKD-EPI la biopsie (ml/min/1.73m ²)	80.85 ± 33.355
eRFG-CKD- EPI la finalul studiului (ml/min/1.73m ²)	75.16 ± 41.09
Proteinurie (g/24h)	1.41 ± 2.167
Prezentare clinică- sindrom nefrotic	3
Prezentare clinică sdr nefritic acut / cronic	3 / 1
Vârsta la prima sarcină (ani)	$23.87 (+/-3.5)$

Statistică descriptivă	
Prima sarcină precede diagnosticul de LES	4
Prima sarcină după diagnosticul de LES	4
Recăderi în sarcină	1.87 ± 1.64
Durata corticoterapiei (ani)	8.5 ± 2.67
Doza de ciclofosamidă (g)	5.17 ± 2.57

Nr sarcini duse la termen în tot lotul: 8

Nr avorturi spontane în tot lotul: 7

Din cele 8 paciente, au prezentat sarcini duse la termen 4 paciente, 2 au avut avorturi spontane și sarcini duse la termen, doar avorturi spontane 2 paciente.

Concluzii: Predomină sarcinile duse la termen, fie că pacientele au mai avut sarcini oprite în evoluție sau nu. Din cauza numărului mic de paciente, nu s-a obținut semnificație statistică la corelarea parametrilor clinico-paraclinici.